

Matriz de classificação canina – A classificação da população canina em função do nível de (1) dependência do cão em relação ao homem e de (2) restrição imposta pelo homem facilita a determinação da acessibilidade relativa dos cães para vacinação, ou seja, os seguintes níveis: +++ Facilmente acessível; ++ Facilmente acessível após sensibilização prévia dos donos; + Acessível mas requer a sensibilização da comunidade e algum apoio na captura ou manuseio do cão para realizar a vacinação parenteral. A vacinação oral também pode ser adequada; e – Inacessível para vacinação parenteral, mas é possível a vacinação oral. Nota-se que os limites entre as diversas categorias são geralmente difíceis de serem definidos se não for desenvolvido um trabalho de pesquisa considerável.

	1. RESTRIÇÃO COMPLETA O cão está fisicamente separado do resto da população de forma permanente	2. SEMI-RESTRIÇÃO O cão tem acesso ao resto da população durante algum tempo	3. SEM RESTRIÇÃO O cão sempre tem acesso à população
1. ÚNICO DONO IDENTIFICÁVEL	CÃO COM DONO SUJEITO A RESTRIÇÕES +++	CÃO ERRANTE COM DONO ++	
2. SEM UM LAR DE REFERÊNCIA ÚNICO, MAS O CÃO É DELIBERAMENTE ALIMENTADO POR VÁRIOS MEMBROS DA COMUNIDADE			CÃO PERTENCENTE À COMUNIDADE +
3. SEM DONO OU MEMBRO DE UMA COMUNIDADE LOCAL QUE DELIBERADAMENTE ALIMENTA OU CUIDA DO CÃO			CÃO SEM DONO +/-